

# 喀痰細胞診説明書

## ◎タンの取り方の注意事項

**注意**

薬液を飲まないようにして下さい。

お子様の手の届かない所に置いて下さい。

1. この容器セットは3日連続採痰用です。1個の容器に3日分のタンをお入れ下さい。
2. タンはなるべく朝起床時(食事前まで)に取って下さい。  
(どうしても無理な場合は朝以外でも可。)
3. 採痰容器に20の目盛りまで薬液が入っていますので、タンを取る時にこぼさないよう注意して下さい。
4. タンを取った後、フタをしっかりとめて、水平方向へ20秒間左右に強く振って下さい。

**確認**

容器の返送の時に、もう一度

フタをしっかりとめて下さい。

## ◎タンの取り方

①



<sup>さいたん</sup>採痰容器を取り出す。

薬液を飲まないよう注意する。

②



大きなセキをしてタンを取る。  
(鼻汁や唾液では十分な検査ができません。)

※採取不良の時、判定不能となる場合があります。

③



タンを容器に直接はき出す。

④



左右に

タンを取る度に、しっかりフタをしめ、中に入っている液とタンが良く混ざるように容器を横にし20秒間左右に強く振って溶かす。

⑤

喀痰細胞診保存液	
採取日	年 月 日
氏名	

タンを取った最初の年・月・日と氏名を必ずラベルに記入して容器に貼る。



2日目・3日目は①～④の動作を繰り返しておこないタンを取る。

タンが出にくいときは、熱湯をうつわに汲み、図のように口をあけて湯気をくりかえし吸いこむと出やすくなります。この時、やけどをしないように注意して下さい。

